



ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร

สำนักงานเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร ๒๒๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลหางน้ำสาคร
อำเภอโนนรมย์ จังหวัดชัยนาท ๑๗๑๗๐ โทร. ๐-๕๖๔๓-๑๕๔๗

เรื่อง ขอความร่วมมือกำจัดลูกน้ำยุงลายทุกวันศุกร์ ป้องกันโรคติดต่ออันตราย

เนื่องจากปริมาณฝนรายเดือนและรายปีของประเทศไทย พ. ศ. ๒๕๖๕ สูงขึ้นถึง ๑๗.๙ เท่า เมื่อเทียบกับค่าปกติซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้มียุงลายเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณเตือนการเข้าสู่ระยะการระบาดที่เร็วขึ้น และคาดว่าปีนี้โรคไข้เลือดออกจากกลั้มาระบาดใหญ่อีกครั้งและหากมีผู้ป่วย covid-๑๙ ติดเชื้อโรคติดต่ออันตรายโดยยุงลายร่วมด้วยอาจทำให้มีอาการรุนแรงส่งผลให้การรักษายุ่งยากและโอกาสที่ผู้ป่วยจะเสียชีวิตมากขึ้น

โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค หลังจากถูกยุงที่มีเชื้อกัดจะอยู่ในร่างกายคนประมาณ ๕-๘ วัน ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการ มีไข้สูงลอย ๒-๗ วัน มีจุดเลือดออกใต้ผิวหนัง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ส่วนใหญ่มีอาการหน้าแดง อาจมีจุดเล็กๆตามลำตัวแขน ขา มักมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายดำ และเบื่ออาหาร โรคนี้เกิดขึ้นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ และมักระบาดในฤดูฝน เพราะมียุงเพิ่มมากขึ้น ยุงลายอาศัยอยู่ภายในบ้านและรอบ ๆ บ้าน ชอบดูดกินเลือดคนเวลากลางวัน ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไข้เลือดออกอาจมีอาการเพียงเล็กน้อย หรืออาจจะเกิดอาการรุนแรงจนเสียชีวิต ความรุนแรงของการติดเชื้อขึ้นกับอายุ ภาวะภูมิคุ้มกัน และความรุนแรงของเชื้อ

วิธีป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก

๑. ป้องกันยุงลายกัด ยุงลายมักจะกัดคนในเวลากลางวัน ควรนอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวดเพื่อป้องกันยุงเข้ามาในบ้าน หลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณมุมอับชื้น ทายากันยุงที่สกัดจากพืชธรรมชาติ
๒. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดไป ยุงลายจะเพาะพันธุ์ในน้ำใส ในภาชนะที่เก็บน้ำใช้ในบ้าน เช่น โอ่งน้ำ ถ้วยรองขาตู้กันมด แจกันดอกไม้ ภาชนะนอกบ้านที่มีน้ำขัง เช่น ยางรถยนต์

การดูแลตัวเองเบื้องต้น

ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวลดไข้ ใช้น้ำยาลดไข้พาราเซตามอล ห้ามใช้ยาแอสไพริน เพราะอาจทำให้เลือดออกได้ง่าย ให้ดื่มน้ำผลไม้ หรือน้ำตาลเกลือแร่บ่อยๆหากมีไข้สูงเกิน ๒ วันควรรีบไปพบแพทย์

เทศบาลตำบลหางน้ำสาครจึงขอความร่วมมือประชาชนและพนักงานเทศบาลทุกท่านร่วมกันป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก โดยทำเป็นประจำทุกวันศุกร์ในหน่วยงานและที่บ้าน เพื่อความปลอดภัยจากไข้เลือดออก ไข้ซิกา และไข้วัดชื่อยุงลาย ด้วย**มาตรการ ๓ เก็บ + ๕ป. ๑ข. + ๕ ส.** ดังนี้

เก็บ ๓ เก็บ เก็บที่ ๑ เก็บขยะ เศษภาชนะขังน้ำแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย วัสดุที่เหลือใช้นำไปขายเป็นรายได้เสริม
เก็บที่ ๒ เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งยุงลายไม่เกาะพัก ชัดล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำ เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์

เก็บที่ ๓ เก็บน้ำ น้ำกินน้ำใช้เก็บให้มิดชิด โดยการเปิดฝาโอ่ง ถึง ไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่

๕ป. ๑ข

๑. ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่
 ๒. เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถึงเก็บน้ำเปลี่ยนน้ำทุกๆ ๗ วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่จะกลายเป็นยุง
 ๓. ปล่อย ปล่อยปลาในลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร เช่น ปลาหางนกยูง ปลากัด ปลากะตัง
 ๔. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่ง สะอาด ลมพัดผ่าน ไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
 ๕. ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย และ
- ๑ข. ชัดภาชนะที่มีน้ำขัง เช่น โอ่งน้ำ เพื่อกำจัดไข่ยุงที่เกาะในภาชนะที่มีน้ำขัง

๕ ส.

สะอาด สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย